NOTE XXVI.

NOUVELLE ESPÈCE DE LÉPIDOPTÈRE DE LA FAMILLE DES LYCAENIDES.

DÉCRITE PAR

P. C. T. SNELLEN.

Pseudodipsas Helena, nov. spec.

Deux mâles et deux femelles. Envergure 28—33 mm.

Mâle: Surface des ailes d'un brun noirâtre, chatoyant en bleu-violet foncé assez terne, sans dessins. Le bord postérieur des ailes est presque noir mais se fondant insensiblement dans la couleur générale. La frange des ailes supérieures est brunâtre à bout blanchâtre, celle des ailes inférieures, dont le bord arrondi est un peu dentelé, est blanche, marquée de points noirs au bout des nervures. Dessous d'un gris foncé, absolument sans dessins; frange comme en dessus mais devenant blanche aux ailes supérieures en approchant du bord intérieur. Sur les ailes inférieures les points noirs de la frange sont un peu plus forts et dans les cellules 1^c à 3, elle est précédée d'une ligne ante-marginale noirâtre.

La femelle est un peu plus grande que le mâle, le bord postérieur des ailes supérieures plus arrondi, les dentelures des ailes inférieures semblent un peu plus fortes parce que les taches noires au bout des nervures sont plus étendues. La couleur de la surface supérieure des ailes est un brun terreux mat uniforme, marquée seulement d'un petit nuage bleu, sur le milieu de la moitié intérieure des ailes supérieures. Ce nuage, formé d'écailles bleues clair-semées, est oblong et une mince trainée d'écailles bleues s'étend de lui vers la base de l'aile. La frange des ailes supérieures a la moitié extérieure plus distinctement blanche que chez le mâle et marquée de faibles points noirâtres au bout des nervures. Le dessous est d'un gris-blanc un peu brunâtre et ainsi beaucoup plus clair que chez le mâle.

Les antennes sont noires, faiblement annelées de blanc pur; leur massue allongée est noire, à extrémité brunâtre. Yeux lisses, en segment de cercle comme chez les Lycaenides d'Europe. Palpes médiocres, relevés, leur dernier article assez pointu. Ils sont presque noirs chez le mâle, d'un blanc bleuâtre à extrémité noire chez la femelle. Pattes courtes, de forme normale, presque lisses; les postérieures avec une paire d'ergots faibles; leur couleur est noirâtre, marquée de blanc. Corps d'un noir brunâtre en dessus; le ventre de la couleur des ailes en dessous.

Cette espèce vient se placer à côté du *Pseud. innotatus* Miskin, Ent. Mo. Mag. XI (1874—75) p. 165, dont la surface inférieure des ailes est aussi sans dessins, marquée seulement de deux petits points noirs vers la moitié de la cellule 1*b* des ailes inférieures. Ces points manquent chez ma nouvelle espèce; de plus, l'*Innotatus* est en dessous d'un blanc pur et en dessus la moitié apicale des ailes supérieures et le bord postérieur des ailes inférieures sont noirs, distinctement séparés du reste qui est d'un bleu d'outremer clair, un peu luisant, totalement différent du bleu d'*Helena*.

Hab. Ile de Roon dans la baie de Geelvinck (Nouvelle-Guinée): un mâle dans ma collection, pris par Mr. H. P. Netscher, lieutenant de marine. — Waigeoe, Morotaï et Ternate: un mâle et deux femelles, pris par feu le Dr. Bernstein (Musée de Leyde).

Ce Musée possède aussi un mâle du *Pseud. innotatus* Misk., provenant des chasses du Dr. Bernstein et pris par lui dans l'île de Ternate.